

libus; capitula globosa, floribus sessilibus, albidis, in alabastro ovoideis. Calyx campanulatus, extus parce pilosulus, dentibus 5, minutis, obtusis. Corolla gamopetala, tubulosa, extus parce pilosula; lobis 5, ovatis, obtusiusculis, mox reflexis. Stamina monadelpha, tubo cylindraceo vel ad apicem sensim dilatato corollam subæquante. *Ovarium glabrum, sessile, basi haud attenuatum*, apice sensim sensimque filiforme; stylus longus, stigma subinconspicuum; ovula circa 15, biserialia. Legumen junius, stipitatum, *parce fulvopilosulum, plus minusve contortum*; adultum (fide Lahaie) latissimum viridissimumque. — Petiolus communis usque 11 cm. longus, pet. secundarii 6-8 cm. longi; foliola 8-10 mm. longa, 2 mm. lata. Inflorescentiæ panicula usque 12 cm. longa, pedunculis capituliferis 10-15 mm. longis. Calyx 1,5 mm. longus; corolla 4-5 mm. longa, lobis vix 1,5 mm. longis. Staminum tubus 3,5 mm. longus.

Sourabava, n° 1891, oct. décembre 1893, voyage à la recherche de la Pérouse (Lahaie). Dans le catalogue de ses récoltes, Lahaie a décrit l'espèce ainsi : « *Mimosa* de 30 pieds de haut, très branchu; fleurs blanches; *siliques* très larges et de couleur très verte; vient près des habitations sur des hauteurs. »

Lahaie ne dit rien de la forme des fruits, l'échantillon en porte de jeunes qui sont déjà tout contournés et qui semblent placer cette espèce dans le genre *Pithecolobium*. L'espèce se rapproche assez par l'ensemble de l'*Albizzia lebbekoides* Benth., mais s'en distingue très facilement par ses folioles plus nombreuses, 2 fois plus étroites, et surtout par la forme de l'inflorescence à nœuds et pédoncules très rapprochés, par le calice deux fois plus long. Les fruits même jeunes de l'*Alb. lebbekoides* ne sont pas comparables aux gousses de même âge du *myriophyllum*.

Parmi les *Pithecolobium* asiatiques et malais, cette espèce se trouve seule dans la section caractérisée par l'ovaire glabre, sans pédicule et par les fleurs sessiles.

25. S. BUCHET. — Nouvelles espèces d'*Arisema* Mart. (2^e note).

Les sept espèces que je vais décrire, d'après des échantillons de l'herbier du Muséum, sont toutes chinoises. Deux ont été rapportées du Yunnan par le père Delavay (*A. saxatile* et

A. lineare); les autres proviennent du Su-tchuen (quatre rapportées de la région de Tchen-kéou-tin par le père Farges, une de Tongolo par le père Soulié).

SECT. II : FOLIA PEDATISECTA.

9. *Arisæma clavatum* S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, persæpè validior et altior. Tuber hemisphæricum, vertice depressum et radices ramulosas afferens; in primo anno ovoideum, laterale. Cataphylla sursum deltoideo-obtusa, *mucronata*; inferiora sursum subrotundata; superius vaginas subæquans, interdum brevius sæpiusve paulo superans. Petioli dimidia parte inferiore vel paulo brevius longiusve vaginantes; vaginæ subæquales, marginibus expansis, convolutis, sursum arcuatis. Folia duo, *late vel latissime* pedatisecta. Segmenta 7-13, *sessilia*, *circa 1 cm. remota, integerrima*, lanceolata, acuminata, basi cuneata; 5 media subæqualia, 10-20 cm. longa, 3-6 cm. lata; costæ valde manifestæ; nervi laterales obliquiores et nervus collectivus tenuissimi. Pedunculus petiolis *valde brevior*, vaginas 3-6 cm. superans. Spatha tota 8-16 cm. longa, plerumque purpurea, rarius subviridis, extra pallidior et parum haudve lineata, intus in dimidia inferiore parte pallidis vittis, *intermediis confluentibus*, in dimidia vel tertia superiore vitta media, *solitaria*, tenuissima rariusve obsoleta, lineata; tubus *obconoideus*, sursum valde dilatatus, 3,5-8 cm. longus, in medio 1,5-2,5 cm. diam., marginibus laxè convolutis, *superne hiantibus atque late, sensim et arcuatim expansis*, haud revolutis; fauces parum obliquæ aut subrecte transversæ; lamina vix tubum subæquans, *ab illo angulatim vel strangulatim manifestissime separata*, erecta, subrhombea vel breviter elliptica, *acuta vel brevissime acuminata*. Spadicis masculi inflorescentia 12-20 mm. longa, elongato-conoidea, 3-4 mm. basi diam., floribus sparsis, purpureis, subsessilibus, diandris; *antheræ loculis globosis*, appositis, basi connatis, apice oculatim nimis dehiscentibus. Inflorescentia feminea 2-2,5 cm. longa, 7-8 mm. diam., ellipsoidea vel conoidea, *ovariis flavis*, obovoideis, in stylo 1 mm. longo attenuatis; *stigma hemisphæricum, papillis albidis manifestis*; ovula 3-4, funiculo longiusculo, basi ovoidea, *superne micropylo latissimo, campanulato dilatata*. Appendix 3-7 cm. longa, sessilis, *erecta, longe et anguste (1-2 mm.) cylindracea, ex ima usque ad quartam partem masculi femineique spadicis organis neutris sparsis vel sparsissimis rariusve paucissimis, hamulato-subulatis oblecta, apice clavula exserta 3-5 mm. crassa, 0,5-1 cm. longa desinens*. Planta feminea sæpe validior quam mascula.

Su-tchuen : district de Tchen-kéou-tin, n° 393 ter; bois d'Héou-pin, près de Tchen-Réou-tin, à 1.400 mètres, n° 1227 [*Farges*].

Cette espèce est tout à fait remarquable par la forme de son appendice. Elle représente un type nouveau dans la section des *Pedatisecta* et ne semble d'ailleurs apparentée à aucune espèce décrite; à peine peut-on la comparer aux *A. concinnum*, *echinatum*, *filicaudatum* du groupe des *Radatisecta*. Ceux-ci présentent bien un appendice étroitement cylindrique et renflé au sommet, mais de dimensions beaucoup moindres, à clavule très petite et sans organes stériles à la base. Ce sont d'ailleurs des plantes d'un tout autre aspect.

10. *Arisæma Meleagris* S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, gracilis, 20-30 cm. alta. Tuber parvum, subglobosum vel compressum, 1-2 cm. diam., in sicco friabile. Cataphylla inferiora sursum rotundato-obtusa; superius sursum rotundato-mucronata vel sensim acuta, semper vaginam valde superans, plerumque dimidiam partem petioli subæquans. Petiolus 13-23 cm. longus, 1,5-2,5 mm. crassus, *tertia vel brevior parte inferiore vaginans*; vagina angusta, marginibus superne obliquissime attenuatis, ore haud manifesto. Folium solitarium, spatham paulum excedens vel subæquans, rariusve multo superans. *Segmenta* 7, rariusve 6-9, sessilia, integerrima vel serrulata rariusve valde erososinuata, elliptico-lanceolata, 3-10 cm. longa, 1-2,5 cm. lata, basi cuneata, apice acuminata, brevissime mucronata vel subulata, intermedia æquilonga, 3-10 mm. remota, ultima utrinque 2, contigua. Pedunculus semper petiolo brevior. Spatha tota 6-9 cm. longa, rosea, purpureo variegata. Tubus primum cylindræus, posterius obconoideus, lamina paulo longior, plerumque pallidior, ad fauces auriculis patentibus vel oblique surrectis, retrorsum semicordatis et lamina angulo acuto valde separatis, porro sensim et arcuatim margines tubi producentibus, instructus. Lamina erecta vel suberecta, breviter elliptica vel ovata, 3,5 cm. longa, 2 cm. ampla, basi paulum strangulata, apice acuta vel acuto-acuminata, intense purpureo-variegata. Inflorescentia brevissima, mascula vel feminea circa 6-8 mm. longa, 1-2 mm. stipitata, subcylindrica vel leviter sursum attenuata. Masculi flores sessiles, vix remoti, inferne 4-andri, sursum 2-3-4-andri; antheræ loculis subglobosis, haud connatis, apice fisso transverso, elongato maxime hiantibus, tum vero acetabuleis, fere bivalvatis. Ovaria flava, obconoidea, superne repentino attenuata, stigmate nigro, globoso, sessili coronata; ovuli 3-6, ovoidei, breve funiculo, micropylo latiusculo, truncato, nucello prominente. Appendix subcylindrica, 2-3 mm. crassa, vix in medio angustior basi repentino, tenuiter longeque (5-10 mm.) attenuato-stipitata, apice parum exserta, rarius inclusa; tota 2,5-3,5 cm. longa inferne pallida, tantum purpureo-variegata, sursum atro-purpurea.

Su tchuen : district de Tchen-kéou-tin, n° 393 bis ¹ et sans numéro [*Farges*].

Var. *sinuatum* S. Buchet.

Folium 8-9 segmentis, valde eroso-sinuatis; petiolus pedunculo saltem duplo longior. Appendix inclusa.

Su-tchuen : Héou-pin, près de Tchen-kéou-tin, alt. 2.500^m, n° 919 [*Farges*].

Cette espèce appartient, par la forme de son appendice, au groupe de l'*A. japonicum*, mais se distingue facilement de toutes les plantes de ce groupe par son aspect grêle, par sa spathe bigarrée presque à la façon d'un damier, par la taille et la forme de ses oreillettes, etc.

11. *Arisæma auriculatum* S. Buchet, sp. n.

Planta 20-30 cm. alta. Tuber parvum compresso-sphæroideum, 18 mm. diam. Cataphylla latiora, membranacea, superius 8-13 cm. longum, petioli vaginam excedens, saltem dimidia inferiore parte haud fissum ac tubulosum, sursum dilatato-apertum, usque 2,5 cm. latum, deltoideum, brevissime mucronatum. Petiolus paulum recurvus, pedunculum tantum excedens, 11-22 cm. longus, 2-3 mm. crassus, tertia inferiore parte fisso-vaginans, vaginæ marginibus, membranaceis, angustis, vix expansis. Folium solitarium; lamina ambitu reniforme, valde latior quam longior, amplissime pedatisecta, costis posticis ² usque 5 cm. longis, perfecte scorpioideis. Segmenta 13-19, integra, oblanceolata, apice acuminata, inferne longe sensimque cuneata, 5-6-plo longiora quam latiora, sessilia, intense viridia, subtus purpurascentia; 3 intermedia subæqualia, propius (circa 3 mm.) insertis; proxima lateralia vix breviora, valde distantiora (6-17 mm.); utrinque 3-4 ultima admodum breviora, extremum perpusillum. Pedunculus 12-18 cm. longus, circa 2 mm. crassus. Spatha tota 9-11 cm. longa, pallida, roseo-purpurea variegata, superne interrupto-vittata; tubus obconicus, marginibus laxè convolutis, sursum repentino dilatatus maximis auriculis divaricatis, patentibus, 3-3,5 cm. longis, basi saltem 1,5 cm. amplis et porro semicordatis, apice deltoideo-obtusis, retrorsum recte truncatis et angulo acuto lamina valde separatis, intensius purpureis; lamina erecta, applanata, 4,5-5,5 cm. longa, tubo tantum brevior, basi substrangulata, ovato-acuta, vel obtusa, in medio 2,5-3 cm. lata. Inflorescentia mascula conica, 12-15 mm. longa, floribus sessilibus, remotis, sparsissimis, ple-

1. La même plante, sous le même numéro, se trouve dans l'herbier Drake del Castillo.

2. Sive subdivisionibus petioli.

rumque diandris; antheræ subatratae (atro-purpureæ?), loculis ovoideis oppositis, appressis, connectivo obsoleto, hiato superiore elliptico. Appendix tota circa 7 cm. longa, suberecta vel sursum oblique porrecta, *longe exserta* sed quam lamina paulo brevior, e basi longissime elongato-conica, 2-2,5 mm. crassa, *subrepentino breveque* (2-3 mm.) *attenuato-stipitata*, *ad apicem versus sensim attenuata*, *gracillima*, superne minute haudve crispulo-undulata, apice subobtusiusculo. Spadix femineus incognitus.

Su-tchuen : district de Tchen-kéou-tin, sans numéro [*Farges*].

Cette espèce, très ornementale, possède, comme la précédente une spathe bigarrée, caractère que l'on ne trouve pas chez d'autres *Arisæma* connus. On la distinguera facilement de l'*A. Meleagris* par la forme différente et l'énorme développement de ses oreillettes, par son appendice très atténué de la base au sommet, subfiliforme dans sa région exserte, par ses feuilles de contour réniforme, à très nombreux segments d'un vert foncé, purpurescent en dessous, etc. Je crois que sa place doit être entre l'*A. Meleagris* et le si curieux *A. cordatum* N.E.Br., mais encore très loin de ce dernier.

12. *Arisæma saxatile* S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, circa 30-35 cm. alta. Cataphylla angusta, superius 6-7 cm. longum, 5-6 mm. latum, sursum lanceolato-acutum. Petiolus 16 cm. longus, *strictus*, 2 mm. crassus, saltem dimidia inferiore parte vaginans; vagina cataphyllum valde excedens, 9-16 cm. longa, marginibus late expansis inferne parallelis et laxè convolutis, superne angustissime scariosis et arcuatim desinentibus. Folium solitarium, *contracte pedatisectum*, 5-7 segmentis linearibus, vix 1 cm. latis, intermedio usque 15-17 cm. longo, lateralibus brevioribus, omnibus sessilibus, integris, basi longe et anguste cuneatis, apice attenuato-acuminatis; nervi laterales pauci, cum costa subparalleli, ex illa angulo acutissimo divaricantes. *Pedunculus brevis* (10-11 cm. longus), *strictus*, 1,5 mm. crassus, sursum dilatatus. Spatha 5-9 cm. longa, *sublutea*; tubus cylindricus vel elongato-ellipsoideus, *marginibus sensim obliquissime ad laminam erectam, angustam* (1-2 cm. amplam), *subconvolutam, lanceolato-acutam desinentibus*. Spadicis feminei inflorescentia subcylindrica, 12-20 mm. longa; *ovariis permultis, confertis, minuto-subglobosis* (1 mm. diam.), stigmate depresso, subsessile (in baccis substipitato) coronatis; stigmatis papillæ ad niveorum pilorum similitudinem elongatæ, *caducæ*; ovuli 3-4, elongati, basi ovoidei, breve funiculo. Semen 1, sub-

globosum. Appendix 2-4 cm. longa, erecta, quam lamina brevior sed tubo exserta haud stipitata, basi subcylindrica, crassiuscula (1-2,5 mm.), ex axi haud incrassata, sursum sensim parumque attenuata, apice obtusa. Spadix masculus incognitus.

Yunnan : rocaïlles des montagnes calcaïres, près de Hé-gni-chan, au-dessus de Ho-kin-tchéou, 24 juillet 1883 [Delavay].

Cette plante, par son appendice dressé, *non stipité*, plus court que la spathe, semblerait se rapprocher de l'*A. Scortechini*, mais elle en diffère très largement par les caractères suivants : segments tous sessiles, concolores sur les deux faces, étroitement linéaires et longuement atténués en coin à la base, les latéraux à côtés symétriques; pédoncule d'un tiers ou de moitié plus court que le pétiole; spathe jaune, au moins en partie, à tube sans auricules; appendice robuste, épais, exsert. Ce sont donc deux espèces relativement éloignées. D'autre part, aucune autre ne lui ressemble, même de loin, si ce n'est l'espèce suivante, mais seulement par la forme des segments.

13. *Arisæma lineare* S. Buchet, sp. n.

Planta circa 75 cm. alta. Cataphylla sursum sensim acuta, mucronata, superius 27 cm. longum, brunnescens, haud membranaceum. Petiolus 50 cm. longus, usque ad tertiam superiorem partem vaginans, in parte libera 2 mm. crassus; vagina anguste fisso-tubulosa (5 mm. diam.), ore brunnea, arcuata, acuminatim desinens. Folium solitarium, contracte pedatisectum, segmentis linearibus, angustissime sub lanceolatis, 1-1,5 cm. latis, inæquilongis, intermedio usque 20 cm. longo, omnibus integerrimis, sessilibus; nervi laterales cum costa subparalleli, ex illa angulo acutissimo divaricantes. Pedunculus circa 65 cm. longus, petiolum valde excedens, 2,5 cm. crassus. Spatha circa 11,5 cm. longa, subviridis; tubus cylindroideus paulumve basi obconoideus, lamina vix separatus, ad fauces marginibus subverticalibus, 5 cm. longus, 15 mm. amplus; lamina ovato-lanceolata, acuta, basi vix fornicata, leviter procurva (sursum deflexa?). Spadicis masculi inflorescentia elongata, subcylindrica, 25 mm. longa, 2,5 mm. crassa, floribus sessilibus remotiusculis, plerumque 2-3-andris; antheræ loculi accubantes, foraminibus ovatis, oppositis, confluentibus. Appendix haud stipitata, saltem 20 cm. longa, inferne circa 1,5 mm. crassa, ex ima basi usque ad apicem sensim sensimque attenuata, sursum subcapillaris, apice clavula tenuissima desinens, e faucium summo usque ad tubi basin decurva, arcuatim deinde por-

recta, sursum sigmoideo erecta. Spadix femineus (vel androgynus?) incognitus.

Yunnan : pâturages près du col de Hee-chan-men, juin 1887, n° 3028 [*Delavay*].

En raison de ses segments foliaires linéaires et de son *appendice sigmoïde*, cette plante doit être rangée au voisinage de l'*A. curvatum* Kunth, dont on la distinguera par *ses fleurs mâles sessiles*, son appendice beaucoup plus long, à courbures multiples, très fin vers le haut, à sommet clavulé et par ses segments à nervures latérales presque parallèles à la côte.

SECT. III : FOLIA RADIATISECTA.

14. *Arisæma brevispathum* S. Buchet, sp. n.

Planta *exilis*, 25-30 cm, alta. *Tuber parvulum*, circa 1,5 cm. crassum, 8-10 mm. altum, vertice applanatum. Cataphylla inferne haud fissa ac tubulosa, superne aperta parumque dilatata, vertice obtuso-ovata; superius 13 cm. longum, petioli vaginam æquans. Petiolus 21-25 cm. longus, 1,5-2 mm. crassus, dimidia inferiore parte vaginans. Folium solitarium, 6-8 segmentis anguste lanceolatis, *serrulatis, valde inæqualibus*, 2-7 cm. longis, 4-10 mm. latis, apice tenuiter acuminato-subulatis. *Pedunculus petiolo valde brevior* (13-16 cm. longus), debilis, paulum nutans. Spatha tota 5,5-6 cm. longa, *viridis, vittis pallidis manifeste lineata*; tubus pallidior, cylindricus, 3,5 cm. longus, 8 mm. diam., *ore recte subtruncatus*; faucium margines *haud recurvi*; *lamina brevissima, erecta*, tubo brevior haudque amplior, *angustius deltoidea, apice brevius* (6-7 mm.) *subulato-caudata*, tota cum acumine 2,5 cm. circiter longa. Spadicis masculi inflorescentia 9-14 mm. longa, tenuis, basi leviter conoidea, superne 1 mm., inferne 1,5-2 mm. crassa, *floribus sessilibus*, subdensiusculis, plerumque diandris; antheræ perfecte didymæ, inæqualiter sejunctæ, loculis globosis, admotis, connectivo subnullo, apice foramine suborbiculare hiantibus. Appendix erecta, tenuiter (1 mm.) cylindrica, 2,5 cm. longa, vix apice obtuso exserta, *basi tantum incrassata, abrupte subtruncata, longius* (1,5-3 mm.) *ac tenuissime* (0,5 mm.) *stipitata*. Spadix femineus incognitus.

Su-tchuen : district de Tchen-kéou-tin [*Farges*].

C'est évidemment de l'*A. exile* Schott que cette plante se rapproche le plus. On l'en distinguera cependant facilement par les caractères suivants : segments plus distinctement ser-

rulés, à dents espacées; pédoncule et fleur nettement dépassés par la feuille; spathe fortement rayée de bandes pâles longitudinales; appendice plus longuement stipité et *fleurs mâles sessiles*; limbe de la spathe terminé par un *acumen bien plus court que lui*.

15. *Arisæma Souliei* S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, usque 70 cm. alta. Tuber subglobosum, 3 cm. circiter diam. Cataphylla inferne longe tubulosa, haudque fissa, quarta vel tertia vel dimidia parte superiore fisso-aperta, parum attenuata, vertice oblongo-obtusa, superius plerumque vaginas petiolorum subæquans. *Petioli longissimi, valde spatham excedentes*, libera parte superiore 25-40 cm. longa, 4-5 mm. crassa; vagina inferiore 25-40 cm. longa, marginibus manifeste expansis, ore scariosis, oblique leviterque arcuatis et sensim desinentibus. *Folia duo, rarius tria, palmatisecta*. Segmenta 6-9, *persæpe 7, late ovato-lanceolata*, vel lanceolata, marginibus integris, omnia plerumque *longe et angustissime cuneato-subansata*, superne sensim acuminata, *longius vel longissime* (usque 6 cm. *caudata*, intermedia 5-8 cm., rarius vix 2,5 cm. ampla, 10-25 cm. longa; costæ crassiusculæ; nervi laterales satis conspicui, e costa angulo acutiore divaricantes, *nonnulli ad apicem versus convergentes*. *Pedunculus vaginam folii superioris modeste superans* (2-9 cm. *exsertus*). Spatha tota, cum acumine et cauda, 15-20 cm. longa, viridis, interdum laminæ *dimidia superiore parte atro-brunnea*, pallidis vittis, sursum conspicuioribus, lineata; tubus cylindroideus, 1-1,5 cm. diam., 5-7 cm. longus, marginibus sursum repentino rotundato-arcuatis, ore subrecte transversalibus, haud vel anguste revolutis; lamina suberecta, applanata, *ovata vel ovato-lanceolata*, basi plus minusve strangulata, *sursum sensim acuminata et longissime caudata, tubo latior* (usque 3,5 cm.), 4-5,5 cm. longa absque cauda eam subæquante vel *persæpe longiore*. Inflorescentia mascula cylindrica, 2 cm. circiter longa, 2,5 mm. diam., *basi stipitata* (2 mm.), floribus modeste remotis, sessilibus, plerumque diandris. Feminea subcylindrica, 2,5-3 cm. longa, 6-7 mm. diam., basi 2,5 mm. stipitata, *ovariis haud appressis, subremotiusculis, brevissime obovoideis*, superne in *stylo manifesto* (0,5 mm. longo), stigmate depresso coronato, attenuatis; ovuli 5-9, vix stipitati, vertice attenuati; semina 1-3, subtrigona, fronte convexa, tergo tantum concava tractumque in longitudine carinata, apice acuta. Appendix *suberecta, persæpe tantum procurva vel oblique porrecta, basi pallida, dilatato-ovoidea*, sublobulata, 6 mm. usque (spadicis masculi 3 mm. tantum) crassa, *inferne repentino et arcuatim attenuato-stipitata, subtruncata* (stipite feminei 5-6 mm., masculi 2-3 mm. longo), supra tumorem proxime plus minusve contracta, deinde ad *apicem obtusulum versus magis magisque sensim attenuata, tubo exserta superiore parte tenuiter cylindrica* (1,5-2,5 cm. longa, 1-1,5 mm. diam.), tantum porrecta, *atro-brunnea*.

Su-tchuen : Tongolo, dans les haies, n^{os} 2989 et 2990 [Soulié].

Cette espèce ne saurait prendre place qu'à côté de l'*A. Jacquemontii* Bl. On la distinguera par son appendice toujours plus droit, d'habitude simplement incliné en avant, plus épais et subtronqué à sa base, cylindrique obtus à son sommet; par son pédoncule longuement dépassé par les feuilles, par le limbe de sa spathe largement et brièvement ovale et par les segments de ses feuilles plus nombreux (6-9 au lieu de 5) assez longuement *filifères*.

ERRATA contenus dans ma précédente note : « Nouvelles espèces d'*Arisæma* » ex H. Lec. *Not. Syst.* T. I, fasc. 12 :

P. 368, douzième ligne; au lieu de : *lamina erecta, dorso gibboso-concava*, lire : *lamina suberecta sæpe tantum procurva, elongato-cymbiformis*.

P. 372, vingtième ligne; au lieu de : [*Thennes*], lire : [*abbé Thermes*].

P. 375, quinzième ligne; au lieu de : *dorso leviter gibbosa*, lire : *dorso inferne convexa, subgibbosa*.

26. A. GUILLAUMIN. — Les Citrus de Nouvelle-Calédonie.

En dehors des *Citrus* introduits récemment à la Nouvelle-Calédonie, il n'y a encore été décrit que deux espèces : 1^o le *Citrus macroptera* Montrouzier, identique au *C. papuana* Bailey de la Nouvelle-Guinée anglaise et au *C. celebica* Koor-ders de Célèbes, étroitement allié au *C. hystrix* DC. de l'Asie, de l'Insulinde, des Philippines, de la Nouvelle-Poméranie et de la Nouvelle-Guinée (qui n'est qu'une variété du *C. Aurantium* L.) et dont il se distingue par ses étamines libres; 2^o le *C. Oxanthera* Beauvisage = *Oxanthera fragrans* Montrouzier dont il me semble impossible de distinguer le *C. Garrawayi* Bailey du Queensland.

Balansa, il y a 40 ans, a découvert dans le nord de la Nouvelle-Calédonie un *Citrus* très différent de toutes les espèces connues et dont je donne ci-après la description.